

AeroBec Autohaler

50 mikrogram/dos eller 100 mikrogram/dos [inhalationsspray](#), lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller [farmaceut](#).
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är AeroBec Autohaler och vad används det för?
2. Innan du använder AeroBec Autohaler
3. Hur du använder AeroBec Autohaler
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av AeroBec Autohaler

Vad innehåller AeroBec Autohaler?

AeroBec Autohaler 50 mikrogram/dos [inhalationsspray](#), lösning

AeroBec Autohaler 100 mikrogram/dos [inhalationsspray](#), lösning

- Det aktiva ämnet är beklometasondipropionat.
- Hjälpsämen är norfluran och [etanol](#)

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg.

1. VAD ÄR AEROBEC AUTOHALER OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

AeroBec Autohaler används vid [astma](#). AeroBec Autohaler är ett kortisonpreparat som motverkar [inflammation](#) och [allergi](#) direkt i lungorna. Genom att minska [inflammationen](#) förebygger man astmaattacker.

Den här typen av medicin används i förebyggande syfte och måste tas regelbundet, även när det inte finns några tecken på symptom.

Full effekt uppnås först efter några dagars behandling.

AeroBec Autohaler är inandningsstyrd och avger automatiskt rätt [dos](#) av medicinen vid inandning.

2. INNAN DU ANVÄNDER AEROBEC AUTOHALER

Använd inte AeroBec Autohaler:

- Om du är överkänslig (allergisk) mot beklometasondipropionat eller något hjälpämne i AeroBec Autohaler.

Var särskilt försiktig med AeroBec Autohaler:

- Om du har **tuberkulos** eller någon annan form av lungsjukdom ska du informera din läkare om detta innan du påbörjar användning av AeroBec Autohaler.
- *Ändra inte **doseringen** utan kontakta din läkare om astmabesvären tilltar eller om din förbrukning av astmaläkemedel ökar.*
- Om du tidigare har behandlats med kortison-tabletter behövs en noggrann kontroll vid övergång till AeroBec Autohaler. Följ noga läkarens doseringsanvisningar. Under de första dagarna ges AeroBec Autohaler tillsammans med kortison-tabletter. Nedtrappning av kortison-tabletter ska ske gradvis. Vid **akutförsämring** då mycket slem ansamlas i luftvägarna kan **kortison** i tablettform behövas som ett komplement till AeroBec Autohaler. En övergång från tabletter till AeroBec Autohaler kan framkalla allergiska symtom t ex. snuva och **eksem** som inte märkts under tidigare behandling med tabletter. Man kan till att börja med även känna trötthet få huvudvärk, muskel- och ledbesvär samt någon gång illamående och kräkningar. Detta beror på att den totala mängden **kortison** i kroppen minskar genom att sjukdomen behandlas direkt i lungorna. Besvären försvinner efter en viss tids behandling.
- Detta läkemedel innehåller små mängder **etanol** (alkohol), mindre än 100 mg per **dos**.
- Sluta att ta AeroBec Autohaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (**angioödem**)
 - svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 - svårigheter att svälja
 - **nässelutslag** och andningssvårigheter.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga din läkare eller **farmaceut** vid användning av AeroBec Autohaler om du är gravid eller planerar graviditet.

Amning

Det är okänt om AeroBec Autohaler passerar över till modersmjölk. Rådfråga din läkare eller **farmaceut** innan du påbörjar behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner:

AeroBec Autohaler har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skarpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller **biverkningar**. Beskrivning av dessa effekter och **biverkningar** finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller [farmaceut](#) om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

3. HUR DU ANVÄNDER AEROBEC AUTOHALER

AeroBec Autohaler ska användas regelbundet, även under symptomfria perioder.

Läkaren kommer att anpassa [dosen](#) individuellt till dig, ändra inte på [doseringen](#) utan att kontakta läkare.

Vuxna och barn över 12 år

En vanlig [dosering](#) är 50-100 mikrogram morgon och kväll. Läkaren kan [initialt](#) förskriva en högre [dos](#), 200-400 mikrogram morgon och kväll. Högsta rekommenderade dygnsdos är 800 mikrogram.

Barn 5-12 år

[Dosen](#) kan behöva individualiseras. Rekommenderad [dos](#) är 50 mikrogram morgon och kväll. Vid behov kan högre [dos](#) ges, dock högst 200 mikrogram/dygn.

Om du upplever att effekten av AeroBec Autohaler är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller [farmaceut](#).


Sprayen verkar något fuktigare och varmare än gamla freonsprayer och smakar annorlunda. Det finns två styrkor av AeroBec Autohaler och din läkare har valt den styrka som passar bäst för dig. Kom ihåg att det är viktigt att ta läkemedlet så som läkaren har ordinerat. På apoteketiketten finns information om hur många [doser](#) du ska ta varje dag och hur ofta. AeroBec Autohaler är en [inhalationsspray](#) där mer av varje [dos](#) kommer ner i lungorna. Läkaren kan därför [ordina](#) en lägre [dos](#) av AeroBec Autohaler än av tidigare [kortikosteroider](#) som du har använt.

Bruksanvisning

Så här används AeroBec Autohaler

1. Tag av skyddslocket genom att dra i bakkanten. Förpackningen behöver inte omskakas före användning.
2. Håll inhalatorn upprätt som figuren visar. Dra i laddaren så att den står rätt upp. Fortsätt hålla inhalatorn upprätt. Var försiktig så att fingrarna inte blockerar luftventilen (märkt X på bild 2) i botten på inhalatorn.
3. Andas ut så mycket du kan, placera munstycket i munnen och slut läpparna tätt kring munstycket.
4. Andas in sakta och djupt genom munstycket. Läkemedlet följer nu med inandningsluften ner i lungorna. Fortsätt inandningen också när du hör ett "klick" och känner smaken av medicin i munnen. Det är viktigt att du fortsätter inandningen efter det att [dosen](#) har lösts ut.
5. Håll andan i 10 sekunder och andas sedan ut sakta.
6. Laddaren måste tryckas tillbaka efter varje [dos](#). Om läkaren har ordinerat mer än en [dos](#) upprepa punkterna 2-6. Efter användning sätts skyddslocket tillbaka.

Skölj munnen med vatten och spotta ut efter avslutad [inhalation](#).



Första gången du använder din spray eller om sprayen varit oanvänd i 14 dagar eller längre måste du först trycka ut två spraydoser i luften innan AeroBec Autohaler kan användas. Gör på följande sätt:

1. Ta av skyddslocket genom att dra i bakkanten.
2. Håll munstycket så att **dosen** som kommer ut riktas bort från dig, ut i luften. Dra i laddaren så att den står rätt upp.
3. För att utlösa en **dos** skjut dosutlösaren i botten av munstycket i den riktning som anges i figuren.
4. För att kunna utlösa den andra spraydosen måste laddaren tryckas ner igen och sedan upprepas punkt 2 och 3. Efter den andra spraydosen trycks laddaren åter ned och AeroBec Autohaler är färdig att användas.



Använd inte den automatiska dosutlösaren när du tar din medicin. AeroBec Autohaler utlöser automatiskt en **dos** när du andas in genom munstycket.

Rengöring

Munstycket torkas på utsidan med en ren och torr trasa eller servett.

Varning: Trasan eller servetten får inte stoppas in i inhalatorn. Det kan förstöra mekanismen.

Ta inte isär inhalatorn. Inhalatorn får inte komma i kontakt med vatten.

Om du använder mera AeroBec Autohaler än vad du borde

Det är viktigt att du tar **dosen** såsom det står på etiketten på förpackningen eller så som din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte **dosen** utan att kontakta läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta AeroBec Autohaler

Ta den bortglömda **dosen** så snart du upptäcker att du glömt att ta din medicin. Fortsätt sedan behandlingen som vanligt.

Ta inte dubbel **dos** för att kompensera för glömd **dos**.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan AeroBec Autohaler ha **biverkningar**.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100): Svampinfektion i munhåla, struphuvud och svalg, halsirritation och heshet.

Risken för svampinfektion minskar om man sköljer munnen med vatten efter varje **inhalation**, vattnet ska spottas ut efter sköljning.

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000): **Nässelutslag, eksem**, hosta, ökande astmasymptom, diarré, huvudvärk och yrsel.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000): **Överkänslighetsreaktioner**, kraftig svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (**angioödem**), illamående. Inhalationsbehandling kan i vissa fall ge upphov till kramp i luftrören.

Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000): Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma, bristningar och blödningar i huden, högt **blodtryck** och ibland diabetes), minskad kortisonbildning i binjurarna, minskad bentäthet, ögonproblem eller fördröjd längdtillväxt hos barn och ungdomar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Sömnstörningar, depression, oro, rastlöshet, överaktivitet, irritabilitet eller beteendestörningar. Dessa effekter ses främst hos barn.

Om du observerar en eller flera **biverkningar** som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller **farmaceut**.

5. FÖRVARING AV AEROBEC AUTOHALER

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Undvik direkt solljus och hög värme.

AeroBec Autohaler ger korrekt **dos** i temperaturer ner till -10°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller etiketten.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Innehållet i behållaren förvaras under tryck. Behållaren får ej utsättas för åverkan.

Denna bipacksedel godkändes senast den 2011-09-22